

# Бромезим® Цинк 10



## Растительный фермент бромелаин с органическим цинком и витамином С

Органический цинк и витамин С в неокислотной форме в составе комплекса «Бромезим Цинк® 10» способствуют нормальному функционированию иммунной системы. С точки зрения физиологии питания подходит для поддержания защитных сил организма при смене сезонов, когда повышается риск развития простудных заболеваний, частых перелетах, связанных с изменением часовых поясов и климатических условий. Его также можно применять курсами в периоды повышенной физической и умственной нагрузки.

### Область применения

- Способствует поддержанию нормальных функций иммунной системы
- Подходит для периода повышенных физических и умственных нагрузок
- Дополнительный источник витамина С, цинка и бромелаина.

### Принцип «чистого вещества»

Для создания нутриентов Biogena использует «чистые вещества» полностью свободные от красителей, консервантов, антиадгезивов, искусственных усилителей вкуса, средств против слеживания, вспомогательных веществ.

- Сырье высшего качества
- Гипоаллергенно чистые вещества\*
- Без консервантов и технологических добавок
- Без искусственных красителей, ароматизаторов, покрытий
- Без глютена
- Без лактозы
- Без фруктозы\*\*
- Оболочки капсул на растительной основе
- Полное соответствие нутриентов стандарту ISO 22000:2005
- Оптимальная совместимость с другими средствами
- Подходит для вегетарианцев и веганов
- Эко-упаковка

\*В ассортименте Biogena минимизировано количество продуктов, ингредиенты которых получены из потенциально аллергенных веществ. \*\* Biogena стремится производить нутриенты без фруктозы, только некоторая часть продуктов содержит незначительное количество природной фруктозы.



ИНГРЕДИЕНТЫ	НА СУТОЧНУЮ ДОЗУ (1 КАПСУЛА)	% ОТ РЕКОМЕНДУЕМОГО УРОВНЯ СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ*
Витамин С	160 мг	266* <sup>1</sup>
Цинк	10 мг	66*
Бромелаин	200 мг	-

\* % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011.

<sup>1</sup> не превышает верхний допустимый уровень потребления.

## СОСТАВ

Аскорбат кальция/L-треонат, бромелаин (из ананаса), гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), глюконат цинка, наполнитель: порошок целлюлозы.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Взрослым по 1 капсуле в день, натощак, за 30-60 минут до еды или не ранее, чем через 2 часа после еды с большим количеством воды.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Ферменты обладают антиагрегантным действием, поэтому не рекомендуется принимать их за 1-2 дня до хирургического вмешательства.

## УПАКОВКА

60 капсул (2 месяца применения), 35 г

Биологически активная добавка. Не является лекарством. Рекомендуемая суточная доза потребления не должна быть превышена. Не является заменой сбалансированного и разнообразного питания. Представленная информация не является рекомендацией к лечению. Перед приемом проконсультируйтесь со специалистом. Подходит для больных диабетом.



Ester-C

DRcaps

